

# Atenolol

## **Indicação:**

Atenolol é indicado para o controle da hipertensão, angina de peito e arritmias, podendo ser usado no tratamento do infarto do miocárdio ou após o infarto, em adultos.

## **Posologia:**

De acordo com a prescrição médica.

## **Administração:**

Atenolol deve ser administrado por via oral, com água, de preferência no mesmo horário todos os dias. O paciente não deve utilizar Atenolol se estiver em jejum por tempo prolongado.

## **Efeitos colaterais:**

Cansaço extremo, mãos e pés frios, tontura, alterações de humor, queda de pressão, desmaio, problemas de estômago e intestino ou boca seca.

## **Contraindicações:**

Atenolol está contraindicado para pacientes com doenças ou problemas de coração, pressão baixa ou muito baixa, problemas de circulação, pacientes com má alimentação ou com feocromocitoma e para pacientes com alergia ao Atenolol ou a outros componentes da fórmula.

## **Advertências e Precauções:**

Antes de usar Atenolol, deverá falar com o seu médico se estiver grávida, pretendendo engravidar ou amamentando, tiver mais de 60 anos, doenças ou problemas nos rins, coração ou tireoide, problemas pulmonares como asma ou falta de ar, diabetes ou níveis baixos de açúcar no sangue, tiver historial de angina no peito ou se estiver a tomar outros medicamentos.

## **Superdosagem:**

Em caso de toma excessiva de Atenolol, deve dirigir-se ao hospital mais próximo, levando a embalagem ou bula do medicamento. Alguns dos efeitos mais comuns que pode sentir após a toma excessiva de Atenolol podem incluir diminuição dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, insuficiência cardíaca ou broncoespasmo.

# Atenolol

## O que devo fazer quando esquecer de tomar esse medicamento?

Se você se esqueceu de tomar a medicação e só se lembrou depois de muito tempo, tome apenas na próxima dose. Duplicar a dose é perigoso. Durante esse período faça controle pressórico para acompanhar.

## Interações medicamentosas:

O atenolol deve ser utilizado com cuidado em pacientes que estão tomando os seguintes medicamentos: verapamil, diltiazem, nifedipino, glicosídeos digitálicos, clonidina, disopiramida, amiodarona, adrenalina (agentes simpatomiméticos), indometacina ou ibuprofeno (para alívio da dor) e anestésicos.

## Interações com alimentos:

A ingestão de Atenolol junto com suco de laranja ou de maçã e com suplementos de cálcio diminuem a absorção. Café e chá também diminuem a absorção devido a formação de quelatos.

### **ATENÇÃO!**

Ele aumenta a sensação de fadiga, contribuindo para a inatividade física e redução do gasto energético.

