

CONTRASTES

	NOME COMERCIAL	FABRICANTE	DOSAGEM	ML	ESTABILIDADE	ARMAZENAMENTO	AQUECIMENTO ANTES DO USO	TEMPO INFUSÃO
CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO	IOPAMIRON	BRACCO	300 I mg/mL	100 ML	USO IMEDIATO	TEMPERATURA AMBIENTE (entre 15°C e 30°C)	AQUECER A TEMPERATURA CORPORAL 37°C	2 - 6 MINUTOS (IV)
CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO	OPTIRAY	GUERBET	320 I mg/mL	50 ML	USO IMEDIATO	TEMPERATURA AMBIENTE (entre 15°C e 30°C)	AQUECER A TEMPERATURA CORPORAL 37°C	0,5 - 4MINUTOS (IV)
CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO	IOPAMIRON	BRACCO	370 I mg/mL	100 ML	USO IMEDIATO	TEMPERATURA AMBIENTE (entre 15°C e 30°C)	AQUECER A TEMPERATURA CORPORAL 37°C	2 - 6 MINUTOS (IV)
CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO	IOMERON	BRACCO	400 I mg/mL	100ml	USO IMEDIATO	TEMPERATURA AMBIENTE (entre 15°C e 30°C)	*	*
CONTRASTE ACIDO GADOXETICO	PRIMOVIST	BAYER	0,25 mmol/mL	10 ML	USO IMEDIATO	TEMPERATURA AMBIENTE (entre 15°C e 30°C)	*	*
CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IÔNICO	IOBITRIDOL	GUERBET	300 I mg/mL	100 ML	USO IMEDIATO	TEMPERATURA AMBIENTE (entre 15°C e 30°C)	*	*
CONTRASTE ACIDO GADOTERICO	DOTAREM	GUERBET	0,5 mmol/mL	10 ML	USO IMEDIATO	TEMPERATURA AMBIENTE (entre 15°C e 30°C)	*	*

LEGENDA:

*Informação não consta em bula.