



ORIENTAÇÕES POS-PROCEDIMENTO CATETERISMO ANGIOPLASTIA OU ARTERIOGRAFIA

- Não dobrar o membro onde foi realizado o exame por 24 horas. Caso ocorra sangramento de pequena quantidade no local, basta comprimi-lo com uma gaze por 10 a 15 minutos. Se houver sangramento mais importante, comprimir por mais tempo e comparecer ao pronto atendimento do hospital.
- Poderá ocorrer a formação de um pequeno hematoma no local do exame, que será absorvido pelo corpo em torno de 10 dias. Recomenda-se fazer compressa fria, para ajudar na reabsorção. Se houver aumento do hematoma, comparecer ao pronto atendimento do hospital.
- Não fazer esforço físico por 10 dias, principalmente envolvendo o membro onde foi realizado o exame. **Evitar:** Subir e descer escadas e ladeiras, dirigir qualquer veículo, andar de bicicleta, relação sexual.
- Somente deve retornar o uso da metformina após 48 horas do procedimento para evitar reação com o contraste utilizado, após esse período de pausa, reiniciar o uso normalmente.
- **No dia seguinte do exame:** Pode andar normalmente, sem esforços, deve-se retirar o curativo e lavar bem o local da punção com água e sabonete neutro, secar e cobrir apenas com um Micropore ou Band-Aid; volte a tomar suas medicações normalmente.
- Observar a frequência e o volume da urina nos dias seguintes do exame. Caso apresente alguma anormalidade, principalmente diminuição da urina, entre em contato com o seu médico ou procure o pronto atendimento do hospital.
- Retornar em consulta com seu médico que solicitou o exame para que ele avalie o resultado e lhe oriente sobre a melhor conduta.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

