

Protocolo para Bloqueios/ Denervação/ Rizotomia Percutânea em Coluna

Dados do Paciente

Nome	Número da carteira da Unimed
------	------------------------------

Nome do médico assistente

Códigos de procedimentos solicitados

.....

.....

.....

Segmento solicitado

.....

.....

1 Tem limitações físicas das atividades de vida diária (AVD'S)?

Sim Não

2 Há quanto tempo apresenta limitações das AVD'S?

.....

.....

3 Fez tratamento conservador?

Sim Não

4 Quais e por quanto tempo?

.....

.....

5 Tem hérnia discal?

Sim Não

6 Tem sinais de estenose ou instabilidade cirúrgica?

Sim Não

7 Tem cirurgia prévia no segmento a ser tratado?

Sim Não

Se sim, quais?

.....

.....

8 Já realizou bloqueio anestésico facetário ou foraminal antes? Qual resultado? (% de melhora)

.....

.....

Nome do (a) Dr. (a)	Especialidade
---------------------	---------------

CRM	Data
-----	------

Protocolo para Bloqueios/ Denervação/ Rizotomia Percutânea em Coluna

O procedimento tem indicação nos seguintes cenários:

1 Dor Radicular Lombar:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

2 Claudicação Neurogênica:

- Dor severa o suficiente para causar algum grau de déficit funcional
- Falha no tratamento conservador adequado, realizado por no mínimo 4 semanas
- Correspondência entre imagem e clínica, dor explicada pela imagem

3 Dor Lombar Baixa, sem sintomas em membros inferiores apenas se:

- Atletas de alto rendimento durante o período de competição
- Grávidas com dor lombar que não respondem a outras formas de tratamento

Não mais que duas injeções na mesma sessão, 3 em 06 meses 6 em 1 ano. As duas injeções da mesma sessão podem ser bilaterais em um único nível ou, unilaterais em dois níveis.